

Histamin Control

Přírodní neutralizátor histaminu

Charakteristika:

Histamin Control je složen z přírodních substancí s nutričními vlastnostmi, které jsou v těle využívány jako kofaktory neutralizující uvolňování histaminu. **Může se použít jako podpora nebo alternativa přírodních kortikoidů nebo jiných medikamentů s antihistaminickými vlastnostmi, nebo jako volba během supresivní fáze.** Reguluje imunitní systém snížením intenzity imunologické reakce.

Dávkování:

Psi:

1 tableta na 10 kg ž. hm. zvířete
2x denně společně s krmením

Kočky a štěňata:

1/2 tablety
2x denně společně s krmením

Složení látek v 1 tabletě:

Quercetin	125 mg
Dimethylglycin	50 mg
Bromelain	50 mg
Askorban sodný	125 mg
Methylsulfonylmethan	150 mg
Laktát zinku	50 mg
Extrakt ze semen vinných hroznů	75 mg
Citrát hořčíku	50 mg

Dostupná balení:

60 tablet
300 tablet
30x10 tablet v blistru

Histamin Control

Významná pomoc při
alergických onemocněních



M+H VET



Objednávejte již nyní u svého distributora.
Více informací na www.mhvet.cz

Dodavatel do ČR a SK:
M+H VET s.r.o.
Londýnská 730/59
120 00 PRAHA 2

Tel: +420 731 616 900
mhvet@mhvet.cz
www.mhvet.cz

Alergická reakce je neadekvátní (přehnanou) odpověď organismu na cizí látky - alergen. V žírných buňkách, které se nacházejí v kůži a respiračním traktu, se uvolňuje histamin. Je to chemický mediátor alergických reakcí a způsobuje vznik symptomů. Antihistaminy jsou látky, které blokují účinek histaminu. Nejpoužívanějšími jsou kortikosteroidy mající vlastnosti protizánětlivé a imunosupresivní. Jednou z nejčastějších alergických reakcí u psů a koček je potravní alergie a hypersensitivita, což je specifická forma reakce na potravu a její složky, která se objeví poté, kdy je aktivován imunitní systém přechodem vodorozpustných vysokomolekulárních glykoproteinů střevní stěnou. Jako zjevný symptom se objeví nesezónní pruritus.

Charakteristika účinných látek v Histamin Control:

Quercetin

Je bioflavonoid s antioxidačními účinky, které umocňují účinek vitaminu C a má tak vliv na korekci zánětlivého procesu.

- inhibuje enzymy podílející se na produkci hlavních zánětlivých mediátorů - prostaglandinů a leukotrienů
- inhibuje produkci histaminu stabilizací bazofilů a žírných buněk (mastocytů)
- působí přímo ve střevě potlačením reakce na potravní alergen
- v klinických studiích bylo prokázáno, že došlo k výraznému snížení alergické reakce na krmivo při předchozím podání quercetinu

O významu a přínosu tohoto flavonoidu i v humánní medicíně existuje nepřeberné množství informací na internetu.

Bromelain

Proteolytický enzym extrahovaný z ananasu.

- zlepšuje trávení proteinů v těle (výrazný proteolytický účinek)
- má protizánětlivý účinek, snižuje edem i bolestivost, působí fibrinolýzu koagulátu, aktivuje protizánětlivé prostaglandiny

Extrakt ze semen vinných hroznů

Proanthocyanidiny mají silný antioxidační účinek proti volným radikálům, mají důležitý význam v řízení zánětlivé a alergické reakce. Inhibitor prooxidačních enzymů.

Methylsulfonylmethan

MSM je přírodní zdroj síry, která působí při antialergické léčbě, protože blokuje vnímavost tkání jako je sliznice, vůči histaminu. Potlačuje symptomy doprovázející respirační alergii. U alergických dermatitid eliminuje svědění.

Dimethylglycin

Derivovaná aminokyselina glycin má svůj význam v regulaci imunitního systému. Umožňuje lepší absorpci kyslíku v buňkách neutralizujících volné radikály.

Askorban sodný

Vitamin C je silný antioxidant, který neutralizuje volné radikály, podílející se na jakémkoliv zánětlivém procesu. Má vliv na správnou funkci imunitního systému.

Zinek

Významný prvek především pro formaci více než 100 enzymatických procesů. Ionty zinku stabilizují membrány plazmatických žírných buněk, potlačují uvolňování histaminu.

Hořčík

Nedostatek tohoto prvku doprovází hyperemie, zvýšení hladiny IgE, neutrofilů. Zvyšuje hladinu prozánětlivých cytokinů, degranulaci žírných buněk, histaminemii a splenomegalii.

Použití přípravku Histamin Control

Vlastnosti jednotlivých komponentů podporují neutralizaci produkce histaminu v organismu. Mají prověřený účinek při neutralizaci bolestivosti a zánětu.

Specifické alergické reakce a jejich symptomy:

Potravní alergie, astma, alergická rhinitida, ekzém, urtikaria.